ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ
„ЗЕМУН ПОЉЕ”

БЕОГРАД - ЗЕМУН

Поштовани пољопривредници и пословни партнери,

Институт за кукуруз „Земун Поље“ сада са већ више од 75 година постојања и успешног рада потврђује свој значај на државном и међународном нивоу. Овом успеху сте и ви дали допринос користећи наш домаћи производ, поштујући традицију и поверење.

Сви наши ЗП хибриди и сорте створени су класичним методама оплемењивања у нашим агроеколошким условима без генетичке модификације. То се темељи на одговорном и континуираном научно истраживачком раду који се прилагођава захтевима тржишта, као и факторима климатских промена. Резултат таквог рада је више од 780 створених хибрида кукуруза, 9 сорти соје и 16 сорти стрних жита, а све то уз тенденцију новог и бољег.

Производња, дорада и паковање семена ЗП хибрида и сорти по највишим стандардима је гаранција квалитета.

Наши хибриди и сорте ће оправдати ваша очекивања, а размена обостраних искустава биће као и увек фактор у постизању већих приноса.

Хвала на указаном поверењу!

ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ „ЗЕМУН ПОЉЕ“



Садржај:

Увод	2
Примена агротехничких мера у гајењу ЗП хибрида кукуруза	4
Хибриди кукуруза	6
Примена агротехничких мера у гајењу ЗП сорти соје	18
Сорте соје	20
Примена агротехничких мера у гајењу ЗП сорти стрних жита	22
Сорте стрних жита	24
Сарадници на терену	28

Легенда:

Жетва у зрну

Берба у клипу

Силажа

Људска исхрана

Толерантност на сушу

Брзо отпуштање влаге

Висок потенцијал за принос

ШАМПИОНСКА ГЕНЕТИКА

Институт за кукуруз
„ЗЕМУН ПОЉЕ“
Београд - Земун

Хибриди кукуруза

Примена агротехничких мера у гајењу ЗП хибрида кукуруза

Избор хибрида прилагодити производним условима, а по потреби се консултовати са стручном службом Института

Кукуруз не треба гајити у монокултури краће или дуже време, већ у плодоредима са стрним житима, зрненим махунаркама, индустријским и крмним биљем и повртем

По жетви стрних жита плитко поорати стрниште на дубини 12-15цм

Ђубрење обавити на основу резултата контроле плодности земљишта, применом у јесен 2/3 до целокупне количине фосфора и калијума и 1/3 азотних ђубрива заједно са орањем на дубини од 25цм

У пролеће употребити преосталу количину минералних ђубрива и обавити предсетвену припрему земљишта са 1-2 прохода комбинованог оруђа

Оптималне количине хранива по 1 ха су: 120-160 кг N; 80-120 кг P_2O_5 и 60-80 кг K_2O

Сетву обавити са правилно подешеном сејалицом у оптималном року, потребним бројем исејаних зрна

Заштитна средства за сузбијање штетних инсеката и корова употребити правилно и на време

Мере неге (култивирање, сузбијање корова, прихрањивање) примењивати по потреби

Наводњавање земљишта периодично примењивати по потреби нормом заливања од 20-50 мм

Бербу кукуруза обавити када је садржај влаге зрна мањи од 30%, а жетву када је влага мања од 20% уз одговарајуће чување.

ZP 299 FAO 280

Касна сетва, рана жетва!

НОВО

Карактеристике:

- Рани хибрид - дужина вегетације до 107 дана
- Висока родност за ране хибриде (до 13 т/ха)
- Изузетно брзо отпушта влагу у сазревању

Препорука:

- Погодан за гајење у свим рејонима (до 800 м н.в.)
- Прилагодљив за гајење у полуинтензивним и интензивним условима производње и за закаснелу сетву
- За рану жетву у зрну и бербу у клипу (закаснела и накнадна сетва)
- Густина сетве 70.000-80.000 биљака/ха

ZP 341 FAO 300

Родан и раностасан!

Карактеристике:

- Средње рани - дужина вегетације око 115 дана
- Висока родност за средње ране хибриде (до 13 т/ха)
- Изузетно брзо отпушта влагу у сазревању

Препорука:

- За гајење и у скромнијим условима производње и за касniју сетву (до 600 м н.в.)
- За жетву у зрну
- Густина сетве 60.000-70.000 биљака/ха

ZP 388 FAO 300

За интензивне услове!

Жетва у зрну | Берба у клипу | Толерантност на сушу | Брзо отпуштање влаге | Висок потенцијал за принос

Карактеристике:

- Средње рани - дужина вегетације око 115 дана
- Врло висока родност за средње ране хибриде (до 14 т/ха)
- Изузетна толерантност на неповољне услове суше
- Брзо отпушта влагу у сазревању

Препорука:

- Прилагодљив за интензивније услове гајења на најплоднијим земљиштима (до 600 м н.в.)
- За жетву у зрну
- Густина сетве 65.000-75.000 биљака/ха

ZP 4007 FAO 400

Леп и родан!

Жетва у зрну | Берба у клипу | Толерантност на сушу | Брзо отпуштање влаге

Карактеристике:

- Средње рани - дужина вегетације око 120 дана
- Висока родност до 15 т/ха за средње ране хибриде
- Толерантан на неповољне услове суше
- Брзо отпушта влагу у сазревању

Препорука:

- Погодан за интензивније услове гајења, али и за слабије плодна земљишта (до 600 м н.в.)
- За жетву у зрну и бербу у клипу
- Густина сетве 65.000-75.000 биљака/ха

ZP 427 FAO 400

Изузетно приносан!

Карактеристике:

- Средње рани - дужина вегетације око 120 дана
- Изузетна родност за средње ране хибриде (до 15 т/ха)
- Толерантан на неповољне услове суше
- Изузетно отпушта влагу у сазревању

Препорука:

- За интензивније услове гајења на најплоднијим земљиштима, а остварује високе приносе и у скромнијим условима производње (до 600 м н.в.)
- За жетву у зрну
- Густина сетве 60.000-70.000 биљака/ха

ZP 434 FAO 400

Увек родан!

Карактеристике:

- Средње рани - дужина вегетације око 120 дана
- Висока родност за средње ране хибриде (до 14 т/ха)
- Изузетно толерантан на неповољне услове суше
- Брзо отпушта влагу у сазревању

Препорука:

- Прилагодљив на скромније земљишне и климатске услове, мада највише приносе остварује у интензивним условима гајења (до 600 м н.в.)
- За жетву у зрну
- Густина сетве 65.000-75.000 биљака/ха

ZP 4567 FAO 400

Висок и стабилан принос!

НОВО

Карактеристике:

- Средње рани - дужина вегетације око 120 дана
- Хибрид врхунског приноса за средње ране (и више од 15 т/ха)
- Толерантан на неповољне услове суше
- Брзо отпушта влагу у сазревању

Препорука:

- За интензивне и скромније услове гајења (до 600 м н.в.)
- За жетву у зрну
- Густина сетве 60.000-70.000 биљака/ха

ZP 457 FAO 400

Изузетно родан и стабилан!

НОВО

Карактеристике:

- Средње рани - дужина вегетације око 120 дана
- Изузетна родност за средње ране хибриде (до 15,5 т/ха)
- Толерантан на неповољне услове суше
- Брзо отпушта влагу у сазревању

Препорука:

- За интензивније услове гајења на плодним земљиштима, а остварује високе приносе и у скромнијим условима производње (до 600 м н.в.)
- За жетву у зрну и бербу у клипу
- Густина сетве 60.000-70.000 биљака/ха

ZP 555 FAO 500

Високородан!

Жетва у зрну | Берба у клипу | Толерантност на сушу | Брзо отпуштање влаге | Висок потенцијал за принос

Карактеристике:

- Средње стасни - дужина вегетације око 125 дана
- Висока родност за средње стасне хибриде (до 15 т/ха)
- Толерантан на сушу

Препорука:

- За интензивне услове гајења на богатим земљиштима и за мањи број биљака по хектару; гаји се до 500 м н.в.
- За бербу у клипу, а може и за жетву у зрну
- Густина сетве 55.000-65.000 биљака/ха

ZP 5550 FAO 500

И за зрно и за клип!

НОВО

Жетва у зрну | Берба у клипу | Толерантност на сушу | Брзо отпуштање влаге | Висок потенцијал за принос

Карактеристике:

- Средње стасни - дужина вегетације око 125 дана
- Потенцијал родности (до 15,5 т/ха)
- Толерантан на сушу и високе температуре
- Брзо отпушта влагу у сазревању

Препорука:

- За интензивне услове гајења на богатим земљиштима и за већи број биљака по хектару (до 500 м н.в.)
- За жетву у зрну и бербу у клипу
- Густина сетве 60.000-70.000 биљака/ха

ZP 560 FAO 500

Проверено родан!

Карактеристике:

- Средње стасни - дужина вегетације око 120 дана
- Хибрид врхунског приноса за средње стасне (и више од 15 т/ха)
- Брзо отпушта влагу у сазревању

Препорука:

- За интензивне услове гајења (до 500 м н.в.)
- За жетву у зрну и бербу у клипу
- Густина сетве 55.000-65.000 биљака/ха

ZP 5601 FAO 500

Врхунски принос и отпуштање влаге!

НОВО

Карактеристике:

- Средње стасни - дужина вегетације око 125-130 дана
- Врхунска родност за средње стасне хибриде (и више од 15,5 т/ха)
- Толерантан на сушу и високе температуре
- Изузетно отпушта влагу у сазревању

Препорука:

- Широко прилагодљив за скромније, полуинтензивне и интензивне услове гајења (до 500 м н.в.)
- За бербу у клипу и жетву у зрну
- Густина сетве 55.000-65.000 биљака/ха

ZP 606 FAO 600

Шампион приноса!



Карактеристике:

- Средње касни - дужина вегетације око 130 дана
- Изузетна родност за средње касне хибриде (и више од 15,5 т/ха)
- Толерантан на неповољне услове суше у својој групи зрења

Препорука:

- Широко прилагодљив за различите услове гајења, а одличан принос даје у условима врхунске агротехнике (до 400 м н.в.)
- За бербу у клипу и жетву у зрну
- Густина сетве 55.000-65.000 биљака/ха

ZP 6263 FAO 600

Родан и толерантан на сушу!

НОВО

Карактеристике:

- Средње касни - дужина вегетације око 130 дана
- Изузетно висока родност до 15,5 т/ха
- Тврди зубан
- Толерантан на сушу и високе температуре
- Брзо отпушта влагу у сазревању

Препорука:

- Прилагодљив на интензивне услове гајења (до 400 м н.в.)
- За бербу у клипу и жетву у зрну
- Густина сетве 50.000-60.000 биљака/ха

ZP 666 FAO 600

Родан у свим условима!

Жетва у зрну | Берба у клипу | Висок потенцијал за принос | Толерантност на сушу

Карактеристике:

- Средње касни - дужина вегетације око 130 дана
- Изузетна родност за средње касне хибриде (и више од 15 т/ха)
- Толерантан на неповољне услове суше у својој групи зрења

Препорука:

- Остварује добре приносе и у скромнијим условима производње (до 400 м н. в.)
- За бербу у клипу и жетву у зрну
- Густина сетве 55.000-65.000 биљака/ха

ZP 677 FAO 600

Традиционално родан!

Берба у клипу | Силажа | Висок потенцијал за принос

Карактеристике:

- Средње касни - дужина вегетације око 130 дана
- Висока родност за средње касне хибриде (до 14 т/ха)

Препорука:

- За најплоднија земљишта у долинама река уз високу примену агротехничких мера (до 400 м н.в.)
- За бербу у клипу и за справљање квалитетне силаже
- Густина сетве 55.000-60.000 биљака/ха, а за силажу 60.000-65.000 биљака/ха

ZP 704 FAO 700

Традиција и поверење!

Берба у клипу | Силажа | Висок потенцијал за принос

Карактеристике:

- Касни - дужина вегетације око 135 дана
- Висока родност за касне хибриде (до14 т/ха)

Препорука:

- За различите услове гајења, посебно у мањим густинама (до 300 м н.в.)
- За бербу у клипу и за справљање квалитетне силаже
- Густина сетве 50.000-60.000 биљака/ха, а за силажу 55.000-65.000 биљака/ха

ZP 707 FAO 700

Родан са крупним клиповима!

Берба у клипу | Силажа | Висок потенцијал за принос

Карактеристике:

- Касни - дужина вегетације око 135 дана
- Изузетна родност за касне хибриде (до 15 т/ха)
- Принос силаже до 70 т/ха

Препорука:

- Погодан за најплоднија земљишта у условима високе примене агротехничких мера (до 300 м н.в.)
- За бербу у клипу и за справљање изузетне силаже
- Густина сетве 50.000-55.000 биљака/ха, а за силажу 60.000-65.000

ZP 735 FAO 700

За врхунску силажу!

Карактеристике:

- Касни - дужина вегетације око 135-140 дана
- Висока родност за касне хибриде (до 14 т/ха)
- Принос силаже до 70 т/ха

Препорука:

- За најплоднија земљишта у условима високе примене агротехничких мера (200 до 300 м н.в.)
- За бербу у клипу и за справљање квалитетне силаже
- Густина сетве 50.000-55.000 биљака/ха, а за силажу 60.000-70.000 биљака/ха

ZP 758 FAO 700

Одличан принос и квалитет силаже!

Карактеристике:

- Касни - дужина вегетације око 135 дана
- Висока родност за касне хибриде (до 14 т/ха)
- Принос силаже до 70 т/ха

Препорука:

- За најплоднија земљишта у условима високе примене агротехничких мера (до 300 м н.в.)
- За справљање квалитетне силаже и бербу у клипу
- Густина сетве 55.000-60.000 биљака/ха, а за силажу 60.000-70.000 биљака/ха

ZP 873 FAO 700

Одлична силажа!

Бербa у клипу

Силажа

Висок потенцијал за принос

Карактеристике:

- Касни - дужина вегетације око 135-140 дана
- Висока родност за касне хибриде (до 14 т/ха)
- Принос силаже до 70 т/ха

Препорука:

- За најплоднија земљишта у условима високе примене агротехничких мера (200 до 300 м н.в.)
- За справљање квалитетне силаже и бербу у клипу
- Густина сетве 60.000 биљака/ха, а за силажу 60.000-70.000 биљака/ха

ZP 611K FAO 600

Одлична кокичавост!

Људска исхрана

Висок потенцијал за принос

Карактеристике:

- Средње касни - дужина вегетације око 130 дана
- Висока родност за хибриде кокичара (до 6 т/ха)
- Запремина кокичавости је 40-43 цм^3/г
- Доброг укуса, лепе боје и мириса и без остатака „љуски“, тј. перикарпа

Препорука:

- За плодна земљишта и услове интензивне агротехнике; добро подноси мањи број биљака по хектару
- Гаји се до 400 м н.в.
- За људску исхрану
- Густина сетве 50.000 - 55.000 биљака/ха

ZP 552b FAO 500

Зрно одличног квалитета!

Берба у клипу

Људска исхрана

Висок потенцијал за принос

Карактеристике:

- Средње стасни - дужина вегетације око 125 дана
- Зрно тамније беле боје (беж)
- Висока родност за средње стасне хибриде (до 14 т/ха)
- Високи и стабилни приноси белог зрна

Препорука:

- Гаји се до 500 м н.в.
- За бербу у клипу и људску исхрану
- Густина сетве 55.000-60.000 биљака/ха

Хибриди зрна црвене боје

ZP 5048 crveni

ZP 7007 crveni

Сорте соје

Примена агротехничких мера у гајењу ЗП сорти соје

Избор сорте прилагодити производним условима, а по потреби се консултовати са стручном службом Института.

Соју не треба гајити у монокултури ни са гајеним биљним врстама код којих се појављују заједничке болести. Најбољи предусеви за соју су стрна жита

После жетве стрних жита обавити плитко заоравање стрништа на 12-15цм

Препоручује се јесење орање на дубини од око 25 цм

Прецизно упутство за ђубрење могуће је прописати после анализе земљишта. Соја само у почетку раста захтева око 50 кг/ха азота, а осталу количину обезбеђује симбиотски

За добро обезбеђена земљишта довољно је до 30кг/ха азота, 15-30кг/ха фосфора и 30-60кг/ха калијума

Предсетвена припрема се обавља на дубини сетве са што мање прохода

Сетву је најбоље обавити у првој половини априла, чим временски услови дозволе. Сејалица треба да буде добро подешена, густина сетве зависи од групе зрења и клијавости семена. Семе треба инокулисати препаратом азотофиксатора пре сетве

Сузбијање корова се обавља третирањем одговарајућим хербицидима, после сетве а пре ницања и углавном до појаве развијеног трећег тролистка

Ако је потребно, може да се обави међуредно култивирање док усев не склопи редове

Наводњавање земљишта треба обавити у критичним фазама развића соје (почетак цветања, цветање и наливање зрна) по потреби, уз норме заливања 20-40 мм

Жетву обавити са влагом зрна 11-15%.

Селена

Стабилна и приносна!

Толерантност на сушу

Висок потенцијал за принос

Карактеристике:

- Сорта 0 групе зрења
- Стабло: неограниченог типа раста
- Боја мања: сива; боја цвета: љубичаста
- Боја зрна: жута; боја хилума: светло браон
- Маса 1.000 зрна је око 150 грама
- Генетички потенцијал родности је око 4,5 т/ха
- Оптимална густина усева: 500.000 биљака/ха
- Добра адаптибилност
- Добра толерантност на услове суше
- Садржај уља: ≈ 21%
- Садржај протеина: ≈ 38%

Лаура

Посебна и приносна!

Висок потенцијал за принос

Карактеристике:

- Нова сорта I групе зрења
- Стабло: неограниченог типа раста
- Боја мања: мркожута; боја цвета: бела
- Боја зрна: жута; боја хилума: црна
- Маса 1.000 зрна је око 200 грама
- Генетички потенцијал родности је око 5 т/ха
- Густина усева: 450.000 биљака/ха
- Садржај уља: ≈ 21%
- Садржај протеина: ≈ 40%

Специфичност:

- Сорта без Кунитз трипсин инхибитора у зрелом зрну
- Може се користити у исхрани ОДРАСЛИХ категорија домаћих животиња непреживара без термичке обраде
- Захтева мањи утрошак енергије у индустријској преради зрна
- Погодна је за прераду за исхрану људи

Лидија

Сигуран принос!

Висок потенцијал за принос

Карактеристике:

- Сорта ране II групе зрења
- Стабло: неограниченог типа раста
- Боја мања: сива; боја цвета: бела
- Боја зрна: жута; боја хилума: светло браон
- Маса 1.000 зрна је око 180 грама
- Генетички потенцијал родности је преко 4,5 т/ха
- Оптимална густина усева: 400.000 биљака/ха
- Садржај уља: ≈ 22%
- Садржај протеина: ≈ 40%

Олга

Висок принос!

Висок потенцијал за принос

Карактеристике:

- Сорта II групе зрења
- Стабло: неограниченог типа раста
- Боја мања: мркожута; боја цвета: љубичаста
- Боја зрна: жута; боја хилума: тамно браон
- Маса 1.000 зрна је око 190 грама
- Генетички потенцијал родности је преко 5 т/ха
- Оптимална густина усева: 400.000 биљака/ха
- Садржај уља: ≈ 22%
- Садржај протеина: ≈ 37%

Сорте стрних жита

Примена агротехничких мера у гајењу ЗП сорти стрних жита

Избор сорте прилагодити производним условима, а по потреби се консултовати са стручном службом Института. Од правилног избора сорте зависи висина и стабилност приноса, квалитет зрна и економска вредност производње

Стрна жита не треба гајити у монокултури, већ у различитим плодоредима. Најбољи предусеви су: зрнене махунарке (соја, детелина, грашак, пасуљ) и кукуруз

Основну обраду земљишта (орање) обавити што раније у јесен, на дубини 20-25 цм. Предсетвену обраду урадити одмах на дубини 10-12 цм комбинованим оруђима или тањирачама и дрљачама

Ђубрење земљишта обавити на основу контроле плодности применом целокупне количине фосфора и калијума у јесен и 1/3 азотних минералних ђубрива

Преостале количине азотних ђубрива употребити у пролеће у два прихрањивања

Оптималне количине хранива по 1 ха су: 120-140 кг N, 80-100 кг P_2O_5 и 40-60 кг K_2O

За сетву користити сертификовано семе. Оптимално време сетве је октобар, дубина сетве 4-5 цм, а густина према препоруци произвођача

У сушним годинама обавезна агротехничка мера је ваљање површинског слоја земљишта, а у влажним дрљање

Корове, проузроковаче болести и штеточине обавезно сузбијати хемијским мерама - пестицидима (хербициди, фунгициди и инсектициди)

Жетву обавити правовремено када је садржај влаге зрна 14-16%, а складиштење на 13-14%

Земунска роса

Сорта озиме хлебне пшенице

Висок потенцијал за принос

Толерантност на сушу

Људска исхрана

- Средње рана сорта
- Висина стабла: 90 цм
- Одлична отпорност на ниске температуре
- Врло добра отпорност на полегање, биљне болести и сушу
- Производни потенцијал за принос у добрим условима производње је 7-9 т/ха, а у одличним изнад 10 т/ха
- Оптимални рок сетве: 10 - 25. октобар
- Норма сетве: 500 - 550 клијавих зрна/м^2 (220-240 кг/ха семена)
- Маса хиљаду зрна: 44-46 г
- Хектолитарска маса: 82-84 кг
- Садржај протеина: ≈ 12%
- Садржај влажног глутена: 24-26%

Аурелиа

Сорта озиме хлебне пшенице

Висок потенцијал за принос

Људска исхрана

- Средње касна сорта
- Висина стабла: 85-90 цм
- Одлична отпорност на ниске температуре
- Врло добра отпорност на полегање и биљне болести
- Производни потенцијал за принос у добрим условима производње је 6-8 т/ха, а у одличним изнад 10 т/ха
- Оптимални рок сетве: 10 - 25. октобар
- Норма сетве: 500 - 550 клијавих зрна/м^2 (230-250 кг/ха семена)
- Маса хиљаду зрна: 41-43 г
- Хектолитарска маса: 80-82 кг
- Садржај протеина: ≈ 12,5%
- Садржај влажног глутена: 25-27%

Осатка НОВО

Сорта озиме хлебне пшенице

- Средње рана сорта
- Висина стабла: 80-85 цм
- Добра отпорност на ниске температуре,
- Врло добра отпорност на проузроковаче биљних болести и осипање семена
- Производни потенцијал за принос у добрим условима производње је 6-8 т/ха, а у одличним изнад 9 т/ха
- Оптимални рок сетве: 1-10. октобар
- Норма сетве: 600 клијавих зрна/м^2 (240-260 кг/ха семена)
- Маса хиљаду зрна: 46 г
- Хектолитарска маса: 78 кг
- Садржај протеина: ≈ 15%
- Садржај влажног глутена: 32%

Нектар

Сорта озимог пивског јечма

- Средње рана сорта
- Висина стабла: 80-85 цм
- Врло добра отпорност на ниске температуре, полегање и биљне болести
- Високе приносе и квалитет остварује у различитим условима производње
- Може се користити за производњу слада (при примени агротехнике за производњу пивског јечма) и исхрану стоке
- Оптимални рок сетве: 5-20. октобар
- Норма сетве: 350-400 клијавих зрна/м^2 (160-180 кг/ха семена)
- Маса хиљаду зрна: 43-45 г
- Хектолитарска маса: 77-79 кг
- Садржај протеина: 10-11%
- Садржај финог екстракта: 78-81%

ЗП Адмирал

Сорта јарог тритикалеа

Силажа

Висок потенцијал за принос

- Рана сорта
- Висина стабла: око 95 цм
- Врло добра отпорност на полегање и биљне болести
- Производни потенцијал за принос зрна је преко 8 т/ха
- Може се користити за исхрану стоке и у прехрамбеној индустрији
- Оптимални рок сетве: 15. фебруар – 1. март
- Норма сетве: 550-600 клијавих зрна/м2 (210-240 кг/ха семена)
- Врло адаптибилна сорта, може се гајити и на мање плодним зенљиштима и брдско-планинским теренима
- Маса хиљаду зрна: 38-40 г
- Хектолитарска маса: 82 кг
- Садржај протеина: 12-13%
- Садржај влажног глутена: 20-25%

Зенит

Сорта озимог тритикалеа

Силажа

Висок потенцијал за принос

- Средње касна сорта
- Висина стабла: 115-125 цм
- Врло добра отпорност на ниске температуре, полегање и биљне болести
- Производни потенцијал за принос у добрим условима производње је 7-9 т/ха, а у одличним условима преко 10 т/ха
- Може се користити за исхрану стоке, као силажа и у прехрамбеној индустрији
- Оптимални рок сетве: 25. септембар - 10. октобар
- Норма сетве: 500 - 550 клијавих зрна/м2 (220-250 кг/ха семена)
- Захтева ранију сетву и плоднија земљишта
- Маса хиљаду зрна: 42-44 г
- Хектолитарска маса: 76-78 кг
- Садржај протеина: ≈ 12-13%
- Садржај влажног глутена: 20-25%

Сарадници на терену
064/840-6349
064/840-6350
064/840-6356
064/840-6351
064/840-6352
064/840-6348
064/840-6155
064/840-6353
064/840-6422
064/840-6464
064/840-6463
SUBOTICA
SOMBOR
BAČKA TOPOLA
KIKINDA
BEČEJ
ODŽACI
BAČKA PALANKA
NOVI SAD
ZRENJANIN
RUMA
SREMSKA MITROVICA
BEOGRAD
PANČEVO
VRŠAC
ŠABAC
LOZNICA
VALJEVO
OBRENOVAC
SMEDEREVO
POŽAREVAC
MAJDANPEK
BOR
ZAJEČAR
KRAGUJEVAC
JAGODINA
PARAĆIN
ČAČAK
UŽICE
KRALJEVO
KRUŠEVAC
IVANJICA
NOVI PAZAR
NIŠ
PIROT
LESKOVAC
MITROVICA
PRIŠTINA
PEĆ
VRANJE
UROŠEVAC
PRIZREN

Телефони:
Централа: 011 3756 704

Комерцијала: 011 3754 955
Маркетинг: 011 3756 705

mri@mrizp.rs
www.mrizp.rs